

Plantas Apropriadas para Bonsái

Se detallan especies aptas para ser cultivadas como bonsai. En cada una se señalan las características que tienen interés para su cultivo y formación. En algunas especies no se especifica: época de poda, alambrado, etc. Estas especies deben seguir las normas generales.

Abies sp - Abeto

Conífera de hoja persistente.

Altura: Pueden alcanzar los 65 m. Ramas desde el suelo casi horizontales.

Poda: En primavera.

Alambrado: En cualquier época.

Estilos: Yoseue, Chokkan.

Albizia julibrissin - Acacia de Constantinopla

Árbol de hoja caduca.

Altura: De 8 a 10 m.

Hojas: Verde claro, compuestas. Foliolos muy pequeños. Flores rosa.

Floración: Entre junio y agosto.

Multiplificación: Por semilla, en primavera.

Poda: Después de la floración.

Alambrado: Después de la floración.

Estilos: Chokkan, Moyogi, Kabudachi, Han-Kengai.

Celtis australis - Almez

Árbol de hoja caduca.

Altura: 20 m.

Hojas: Simples, dentadas. Verde sombra.

Multiplificación: Por semilla en primavera, después de estratificarse.

Poda: En primavera.

Alambrado: En primavera.

Estilos: Chokkan, Yoseue, Moyogi.

Ginkgo biloba - Árbol de los escudos

Árbol de hoja caduca.

Altura: Hasta 30 m.

Especie: Dioica. Para formar como bonsai se utilizan los pies masculinos.

Hojas: Simples, verde claro, en forma de abanico.

Multiplificación: Por semillas.

Pinzamientos: En primavera y verano.

Alambrado: En cualquier época.

Estilos: Chokkan, Yoseue.

Cercis siliquastrum - Árbol de Judea o Árbol de amor

Arbolito de hoja caduca.

Altura: De 4 a 10 m.

Hojas: Redondas y enteras.

Flores: Rosadas, aparecen entre marzo y abril, antes de salir las hojas.

Multiplificación: Por semilla.

Poda: Evitar podas. La formación es a base de pinzamientos y recortes.

Estilos: Moyogi.

Lagerstroemia indica - Árbol de Júpiter

Arbusto o Arbolillo de hoja caduca.

Corteza: Lisa con tonalidades rojizas de efectos ornamentales. Es muy sensible.

Floración: De julio a septiembre.

Flores: Rosa fucsia.

Multiplificación: Por esquejes plantados a principios de verano.

Poda: A principios de primavera.

Alambrado: En primavera. El alambre debe envolverse en cinta de papel para no dañar la corteza.

Estilos: Moyogi, Han-Kengai.

[Elaeagnus angustifolia](#) - [Árbol del Paraíso](#)

Árbol de hoja caduca.

Altura: Hasta 10 m.

Corteza: Muy fisurada y epidermis de las ramas jóvenes muy plateada.

Hojas: Verde-gris en el haz y plateadas en el envés.

Floración: De mayo a junio. Flores amarillas y olorosas.

Multiplificación: Siembra en primavera y estratificación en invierno. Por esqueje leñoso en invierno.

Poda: En primavera.

Alambrado: En primavera.

Estilos: Moyogi.

[Acer palmatum](#) - [Arce](#)

Árbol de hoja caduca. Requiere suelos ácidos.

Hojas palmeadas: De 5 a 9 lóbulos, dentadas y muy recortadas. La variedad *atropurpureum* tiene tonalidades púrpura oscuro.

Poda: En primavera.

Alambrado: De primavera a otoño.

Estilos: Yoseue, Chokkan, Moyogi, Kengai, Han-Kengai.

[Rhododendron sp](#) - [Azaleas](#)

Variedades: Existen infinidad de variedades que presentan flores de distintos colores.

Todas ellas poseen la corteza delicada y la madera quebradiza.

Transplante y Poda de Raíces: Finales de primavera, siempre y cuando no estén en flor.

Pinzamientos: En verano.

Poda: En verano.

Estilos: Moyogi, Ishizuki.

[Berberis thunbergii var. atropurpurea](#)

Arbusto de hoja caduca.

Altura: De 1,5 a 2 m.

Follaje: Muy denso de color rojizo.

Multiplificación: Por semilla, en marzo. Por esqueje a finales de verano o principios de otoño.

Estilos: Kabudachi, Han-Kengai.

[Buxus sempervirens](#) - [Boj](#)

Árbol de hoja persistente.

Altura: Hasta 5 m.

Hojas: Pequeñas. Follaje denso.

Multiplificación: Por esquejes entre septiembre y marzo.

Poda: En primavera.

Alambrado: En cualquier época.

Estilos: Yoseue, Chokkan, Moyogi, Ishizuki, Han-Kengai, Kabudachi.

[Euonymus japonicus](#) - [Bonetero del Japón](#)

Arbusto de hoja persistente.

Género: Existen diversas variedades con las hojas matizadas en blanco o amarillo.

Multiplificación: Por esqueje, preferentemente en invierno.

Poda: En primavera.

Pinzamientos: Durante todo el año.

Alambrado: En primavera.

Estilos: Todos los estilos excepto el Kengai.

[Camelia japonica](#) - [Camelia](#)

Árbol o Arbolito de hoja persistente.

Altura: Variable.

Hojas: Coriáceas verde oscuro. Flores de gran valor ornamental.

Floración: Varía según las variedades.

Multiplificación: Por esqueje o semilla.

Poda y Recortes: Después de la floración.

Alambrado: Después de la floración.

Estilos: Moyogi, Han-Kengai.

Carpinus betulus - **Carpe o Abedulillo**

Árbol de hoja caduca.

Altura: De 10 a 25 m.

Hojas: Doblemente dentadas. Corteza lisa y gris.

Multiplificación: Por semilla, en febrero.

Transplante: A principios de primavera.

Estilos: Chokkan, Yoseue.

Cedrus sp - **Cedro**

Conífera de hoja persistente.

Altura: Gran porte.

Hojas: Verdes o glaucas.

Multiplificación: Por semilla. Las variedades se injertan.

Poda: En cualquier época.

Alambrado: En cualquier época.

Estilos: Chokkan, Yoseue, Moyogi.

Cupressus sp - **Ciprés**

Arboles de hoja perenne, de gran porte piramidal o columnar.

Multiplificación: Por semilla a finales de invierno.

Pinzamientos: En primavera y otoño.

Alambrado: En cualquier época.

Estilos: Chokkan, Yoseue, Shakan, Fukinagashi.

Cornus florida - **Cornejo**

Arbolito de hoja caduca.

Hojas: Verde brillante.

Floración: Simultánea a la aparición de las hojas. Los frutos son pequeños, de color rojo, y permanecen en el árbol hasta el invierno.

Multiplificación: Por semillas, que deben estratificarse durante un año. También por esqueje en mayo-junio.

Poda: En verano.

Alambrado: En primavera.

Estilos: Chokkan, Moyogi.

Cotoneaster horizontalis

Arbusto de hoja caduca y porte rastrero.

Flores: Blancas y pequeñas. Frutos rojos.

Multiplificación: Por semillas, en enero-febrero. Por esqueje en agosto-septiembre, en invernadero.

Poda: En primavera.

Alambrado: En primavera.

Estilos: Ishizuki

Erythrina crista-galli - **Cresta de gallo**

Árbol de hoja caduca.

Altura: Hasta 6 m.

Floración: De junio a agosto. Flores grandes de color rojo carmín.

Multiplificación: Por semilla en invernadero o por esquejes en abril y mayo.

Poda: En invierno.

Alambrado: En primavera.

Estilos: Moyogi.

Cryptomeria japonica

Arbusto de hoja persistente.

Altura: Hasta 60 m.

Hojas: Verde-azuladas, en invierno adquieren una tonalidad rojiza.

Multiplificación: Por semilla en otoño. La germinación se produce en mayo.

Poda y Alambrado: En primavera.

Estilos: Chokkan.

[Juniperus communis](#) - [Enebro](#)

Árbol pequeño de gran longevidad.

Altura: Hasta 10 m.

Hojas: Aciculadas de 7 a 15 mm de longitud, con dos líneas glaucas en el haz y verdes en el envés.

Multiplicación: Por semilla o por esqueje.

Pinzamientos: En primavera y otoño.

Transplante y poda de raíces: En primavera.

Alambrado: En cualquier época.

Estilos: Chokkan, Yoseue.

[Crataegus monogyna](#) - [Espino albar](#)

Arbusto o Arbolillo.

Altura: Hasta 10 m. Espinoso.

Flores: Blancas y frutos rojos y pequeños.

Multiplicación: Por semilla en otoño. La germinación se produce en mayo.

Transplante y Poda de Raíces: En primavera.

Poda y Alambrado: En verano.

Estilos: Ishizuki

[Robinia pseudoacacia](#) - [Falsa Acacia](#)

Árbol de hoja caduca.

Altura: Hasta 25 m.

Corteza: Agrietada, de gran valor ornamental.

Hojas: Compuestas con folíolos ovales, enteros y lisos, de color verde claro.

Floración: De abril a junio

Multiplicación: Por semilla, a finales de invierno.

Poda: En invierno.

Alambrado: En primavera.

Estilos: Moyogi, Yoseue, Chokkan, Shakan.

[Chamaecyparis sp](#) - [Falso ciprés](#)

Género: Engloba gran cantidad de árboles y arbustos de diversas formas, alturas y colores. Es uno de los géneros favoritos para cultivar como bonsai.

Multiplicación: Por semilla y esqueje.

Poda: En cualquier época. Los pinzamientos en primavera y otoño.

Alambrado: En cualquier época.

Estilos: Cualquier estilo.

[Fraxinus excelsior](#) - [Fresno](#)

Árbol de hoja caduca.

Altura: Hasta 40 m.

Tronco: Gris, delgado y surcado.

Hojas: Compuestas de color verde pálido.

Multiplicación: Por semilla.

Pinzamientos: En verano y otoño.

Estilos: Chokkan, Yoseue.

[Wisteria sp](#) - [Glicinia](#)

Arbusto trepador caduco.

Altura: Hasta 10 m.

Hojas: Compuestas.

Flores: Violáceas o malva, de gran interés ornamental.

Multiplicación: Por acodo simple terrestre.

Pinzamientos: Cuando desaparecen las flores.

Recortes: Cuando desaparecen las flores.

Poda: En invierno.

Alambrado: En primavera.

Estilos: Kengai, Han-Kengai.

[Punica granatum](#) - Granado

Pequeño árbol de hoja caduca. Se cultiva como bonsai por el valor ornamental de sus flores y frutos. La variedad miniatura **Punica granatum 'nana'** es muy apta para educarla como **madame bonsai**.

Altura: De 3 a 6 m.

Transplante y Poda de Raíces: En primavera u otoño.

Pinzamientos: En primavera y otoño.

Poda: En primavera y verano.

Alambrado: En primavera.

Estilos: Moyogi, Shakan.

[Fagus sylvática](#) - Haya

Árbol de hoja caduca.

Altura: Hasta 35 m.

Corteza: Lisa de color gris metálico.

Hojas: Lustrosas, de color verde oscuro, se vuelven rojizas antes de caer.

Multiplicación: Por semilla, en primavera.

Pinzamientos: En primavera y en verano.

Alambrado: En primavera.

Estilos: Chokkan, Yoseue.

[Syringa vulgaris](#) - Lila

Arbusto de hoja caduca.

Recortes: Después de la floración.

Poda: Después de la floración.

Estilos: Yoseue, Kabudachi, Moyogi.

[Magnolia soulangeana](#) - Magnolia

Pequeño árbol híbrido de hoja caduca.

Altura: De 5 a 6 m.

Floración: En abril-mayo. Flores rojas.

Multiplicación: Utilizar plantas de vivero.

Poda: Después de la floración.

Alambrado: A principios de la primavera.

Estilos: Moyogi.

[Chaenomeles japonica](#) - Membrillo del Japón

Arbusto de hoja caduca.

Hojas: Verde oscuro en el haz. En el envés presentan una lanosidad blanca.

Floración: A principios de primavera. Flores blancas, rosas o rojas, según las variedades.

Poda: En primavera-verano.

Estilos: Kabudachi, Moyogi.

[Myrtus communis](#) - Mirto

Arbusto de tipo mediterráneo, denso, de hoja perenne, muy rameado.

Hojas: Pequeñas y coriáceas.

Flores: blancas.

Multiplicación: Por esqueje y por semilla.

Recortar: Durante todo el año.

Alambrado: En cualquier época.

Estilos: Todos los estilos.

[Ulmus sp](#) - Olmo

Arbol de hoja caduca.

Altura: Hasta 30 m.

Corteza: Oscura y agrietada.

Hojas: Verde brillante en el haz y pubescentes en el envés.

Multiplicación: Por semillas y esquejes.

Transplante: En invierno.

Pinzamientos: En primavera.

Poda: En invierno.

Alambrado: En cualquier época.

Estilos: Chokkan, Yoseue, Hokidachi.

Pinus sp - Pino

Árboles de hoja perenne.

Especies en España: Pinus Pinea (pino piñonero), Pinus Halepensis (pino carrasco), Pinus Pinaster (pino marítimo), Pinus Uncinata (pino negro), Pinus Silvestris (pino albar o rojo).

Multiplicación: Por semilla.

Transplante y Poda de Raíces: En primavera u otoño.

Pinzamientos: En primavera.

Poda: A principios de verano.

Alambrado: En otoño-invierno.

Estilos: Cualquiera, excepto el Kabudachi.

Quercus sp

Variedades: Especies mediterráneas: el Quercus ilex (encina), el Quercus suber (alcornoque), poseen hojas pequeñas y coriáceas, por lo que son muy aptas para cultivarlas como bonsais.

Recortes: Durante todo el año.

Transplante y Poda de Raíces: En primavera u otoño.

Poda: A principios de primavera.

Alambrado: A principios de primavera.

Estilos: Moyogi, Shakan, Chokkan, Yoseue.

Rosmarinus officinalis - Romero

Arbusto mediterráneo aromático de hoja persistente.

Flores: Azuladas durante todo el año.

Multiplicación: Por semilla, en primavera.

Recortes: En verano.

Alambrado: En primavera.

Estilos: Moyogi, Kabudachi, Hokidachi.

Salix babylonica - Sauce llorón

Árbol de hoja caduca de rápido crecimiento. Porte llorón.

Altura: Alcanza los 20 m.

Pinzamientos: Como tiene un crecimiento rápido es preciso pinzarlo continuamente.

Poda: En febrero.

Alambrado: A finales de primavera.

Estilos: Han-Kengai, Hokidachi.

Sorbus aucuparia - Serbal de los pajareros

Árbol de hoja caduca.

Altura: Hasta 20 m.

Floración: Es ornamental por sus hojas compuestas y sus frutos pequeños de color rojo que aparecen en verano y permanecen en el árbol hasta enero.

Multiplicación: Por semilla.

Pinzamientos: A principios de verano.

Poda: A finales de invierno.

Estilos: Yoseue, Hokidachi.

Cytisus scoparius - Retama

Arbusto de hoja persistente.

Hojas: Trifoliadas.

Floración: En primavera o a principios de verano. Flores amarillas.

Multiplicación: Por semilla.

Poda: En verano, al igual que los pinzamientos.

Alambrado: En primavera. Doblar las ramas con cuidado para evitar desgarrones.

Estilos: Ishizuki, Han-Kengai.

Tamarix sp - Tamarindo

Arbusto o Arbolillos.

Altura: Hasta 8 m.

Flores: Rosadas pequeñas que aparecen entre junio y agosto.
Hojas: Pequeñas escuamiformes, verde brillante o azuladas.
Multiplicación: Por esquejes de madera dura.
Poda: En primavera.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Han-Kengai, Moyogi, Ishizuki, Hokidachi.

Taxus baccata - Tejo

Árbol o Arbusto de hoja perenne.

Altura: Hasta 15 m.

Floración: El tronco es rojizo oscuro. La madera es elástica y flexible. Las hojas son de color verde oscuro.

Multiplicación: Por semillas.

Transplante: En primavera.

Pinzamientos: En verano.

Estilos: Chokkan, Yoseue.

Tilia sp - Tilo

Árbol de hoja caduca.

Hojas: En forma de corazón.

Multiplicación: Por semillas.

Recortes: En verano.

Pinzamientos: En verano.

Poda: A finales de invierno.

Alambrado: En primavera.

Estilos: Hokidachi, Moyogi, Yoseue.

Thymus vulgaris - Tomillo

Planta mediterránea aromática.

Multiplicación: Por semillas en primavera.

Alambrado: En primavera.

Estilos: Hokidachi, Moyogi, Kabudachi.

Parthenocissus quinquefolia - Viña Virgen

Planta trepadora de hoja caduca.

Hojas: Palmeadas con 5 folíolos que adquieren tonalidades rojizas antes de desprenderse.

Multiplicación: Por semilla en octubre-noviembre o por esquejes en primavera.

Recortar: En verano.

Alambrado: En primavera.

Estilos: Kengai y Han-Kengai.